~~1170~~

n°: 155.

raport de l'ouverture du Corps de Mr taborau dorval

Mr taborau dorval est mort le 30 Xbre 1753. a une heure moins un quart du matin, et l'ouverture de Son corps a esté faite le lendemain lundi 31e dudit mois a huit heures du matin par Mr Sue maitre en l'art et Science de chirurgie du college de St cosme, et conseiller de la même academie, en presance de Mr pibrac ecuÿer, chevalier de l'ordre roÿal de St michel, premier chirurgien de feüe la reïne d'espagne, un des quarante conseillers de l'academie roÿale de chirurgie, et premier chirurgien major de la noblesse de l'ecole roÿale militaire du roÿaume.

aprés avoir ouvert la poitrine, et levé le sternum, par l'examen que nous avons fait de toutes les partie contenües dans cette cavité, nous avons reconnu.

premierement, le poulmon du côté droit fletri; et adherant a la pleyre dans toute Son etendue.

le poulmon du côté gauche gorgé de Sang, adherent par Sa partie posterieure a la pleyre; dans le pericarde nous avons trouvé trez peu d'eau.

le Cœur estoit fort petit et flasque, et cequil ÿ avoit de particulier, et dont nous n'avons pas veu encore d'exemple les valvules des deux ventricules du cœur, et les colomne charnues avoient esté ataquées d'une inflamation gangreneuse au point quelles Se dechiroint a la moindre pression.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

carton 4
n°- 43

aux deux parties laterales externes du Basventre, nous
avons remarqué plusieurs flictenes a la peau remplies de
Serosité; ensuite on a ouvert le Basventre, et aijant renversé
les tegumens, nous avons remarqué environ trois pintes deau
epanchée dans cette capacité; lestomach dune grandeur
enorme de même que les intestins, tous ces visceres etoient
remplis dair, cequi marquoit une Seconde espece dhidropisie
que nous apelons timpanite intestinale, et celle qui avoit formé
lepanchement de la Serosité dans le ventre Se nomme
asciite.

Lepiploon a esté trouvé obstrué en plusieurs endroits avec des
taches gangreneuses despace en espace.

La rate estoit fort grosse, schirreuse remplie dun Sang extremement
epais et noir de meme que toute la Substance de cette
partie.

Le foije estoit noir de la même couleur quetoit la rate, dune
grandeur extraordinaire, et schirreux dans toute Son
etendue.

Les reins etoient gorgés de Sang et dune Substance molle
nous avons encore remarqué plusieurs taches gangreneuses
despace en espace a lintestin jejunum, et au mesantere.

Le reste des parties contenües dans cette capacité nous
ont parû dans leur état naturel.

nous navons pas ouvert la teste, attendû quil ne setoit rien

passé pendant la maladie qui peut nous faire Soupconer
quelque cause de mort; il est etonent qu'un homme puisse
vivre aussi longtems avec une multiplicité des causes de
mort dans les parties les plus principales a la vie, nous
avons reconnu un Sang apauvri, avec une humeur
scorbutique qui à infecté les parties que nous avons
detaillé. fait a paris le 31 Xbre 1753.

Sibvars   Guë

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE